
Ребелсас является современным препаратом для терапии сахарного диабета 2-го типа. Продается в форме таблеток, каждая из которых содержит 7 мг активного вещества. В упаковке 30 шт. Этот препарат предназначен для пациентов, которым требуется эффективное снижение уровня сахара в крови.

Фармакологическое действие

Семаглутид является агонистом рецепторов GLP-1, что приводит к снижению уровня глюкозы в крови. Препарат стимулирует секрецию инсулина и замедляет выделение глюкагона. В результате терапии данным медикаментом наблюдается статистически значимое снижение показателей HbA1c.

Семаглутид обладает высоким биодоступностью и длительным периодом полувыведения, что позволяет применять препарат один раз в сутки. После перорального применения максимальная концентрация в плазме крови достигается примерно через 1-2 часа. Препарат связывается с белками плазмы и метаболизируется с последующим выводом в основном через почки.

Показания

Применение Ребелсаса показано у больных с сахарным диабетом 2-го типа: в качестве монотерапии, когда диета и физическая активность недостаточны; в комбинации с другими гипогликемическими препаратами.

Противопоказания

К абсолютным ограничениям для приема рассматриваемого лекарственного средства относятся:

- наличие тяжелых аллергических реакций на семаглутид или компоненты препарата;
- беременность и период лактации;
- дети и подростки до 18 лет;
- почечная или печеночная недостаточность тяжелой степени;
- сердечная недостаточность высокой степени.

Побочные эффекты

К побочным эффектам относят: тошноту, рвоту; диарею или запор; головную боль; гипогликемию при совместном применении с другими гипогликемическими средствами; боли в животе; озноб, повышение температуры.

Режим дозирования

Один раз в сутки по одной таблетке. Дозу можно увеличивать на 7 мг каждую неделю до максимальной дозы 14 мг в сутки, согласно рекомендациям врача.

Особые указания

Препарат не предназначен для лечения сахарного диабета 1-го типа.

Перед началом терапии и в процессе лечения необходимо регулярно контролировать показатели HbA1c.

Если у пациента есть противопоказания или побочные эффекты, связанные с другими препаратами, необходимо проконсультироваться с врачом перед началом терапии Ребелсасом.

Не рекомендуется применение препарата одновременно с алкоголем, так как это может усилить некоторые побочные эффекты.

Перед началом применения Ребелсаса и периодически в течение терапии рекомендуется проводить анализы функции почек и печени.

В случае наличия симптомов гипогликемии необходимо немедленно проконсультироваться с врачом.

Медики о препарате

Медицинские данные и статистические исследования показывают эффективность Ребелсаса в сравнении с другими гипогликемическими препаратами. Он хорошо переносится большинством пациентов и может быть использован как в монотерапии, так и в комбинации с другими препаратами.

Соблюдение всех указаний по применению и дозировке крайне важно для достижения наилучших результатов терапии.